

Esquema de Vacunación

W m e e e

Reaen nacido

Hepatitis B

única dosis

Se pone en el hombro
derecho

2 meses

polio mielitidis - primera dosis

Se pone intramuscular

- Pentavalente - 1ra dosis

Se pone en el muslo dere.

- Polio virus - 1ra dosis

se administra vía oral

- Neumococo - 1ra dosis

vía intramuscular.

4 meses

- Poliomielitis - 2da dosis
via intramuscular
- Pentavalente - 2da dosis
se pone muslo derecho
- Rotavirus - 2da dosis
via oral
- Neumococo - 2da dosis
via intramuscular

6 meses.

polio mielitis 3ra dosis
via intramuscular.

Pentavalente 3ra dosis
muslo derecho.

Influenza.
muslo izquierdo 7va dosis

7 meses

Influenza

2da dosis

moslo izquierdo.

12 MESES

- SPPH - Tra dorsif Ca

Sc font brazo
izquierdo

- NEUMOCO

Refuerzo

intramuscular.

15 meses

HEPATITIS A única
región anterolateral
externa del muslo.

→ varice la única
vía subcutánea.

18 meses.

DFT 1er refuerzo y 2o
intra muscular brazo
izquierdo

Polio mielitis 1er re-
intra muscular

SPR 2da dosis
brazo izquierdo.

48 meses

- DPT 2do refuerzo
via intramuscular.

- Poliomielitis 2do refuerzo
20.
intramuscular.

De 9 a 26 años.

VP H. Menor 15 años
2 dosis 2da dosis 6 me.

Via intramuscular
parte superior brazo.

Mayor 15 años

3 dosis - segunda dosis
1 mes despues 3ra dosis
5 meses despues

Adulto mayor

- Hepatitis B.
intra muscular
2 de dosis des 1 mes despues
3 dosis 5 meses despues.
- Hepatitis A.
Dos dosis 2da dosis
6 meses despues.
- Influenza- una dosis
al año.
- Neumococo- 2 dosis
6 meses despues.
- Tdap
única dosis