

Ensayo

Introducción

El desmayo suele ocurrir cuando la presión sanguínea baja de repente y causa que el flujo de la sangre al cerebro disminuya.

Desarrollo

Son pérdidas transitorias del conocimiento y del tono muscular. Se deben a una disminución del riego sanguíneo de todo el cerebro, de inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea completa. Lo normal es que se recuperen rápido.

A veces pueden quedar síntomas residuales, como sensación de fatiga, dolor de cabeza o malestar durante horas.

• En la lipotimia o desmayo el niño

nota que se va a desmayar y se recupera rápido.

- En el síncope la caída al suelo es brusca y tarda algunos minutos en reanarse - puede deberse a problemas cardíacos

- las causas del desmayo son: ejercicio, deshidratación por esfuerzo o calor, ansiedad, dolor brusco por traumatismo u otras cosas, tos intensa y persistente, falta de sueño, entre otros.

Los desmayos o vahídos, también conocidos con el término médico de "síncope" son comunes entre los jóvenes tanto como 1 de cada 4 niños y adolescentes sanos se han desmayado, la experiencia puede dar miedo por lo general la causa no es grave.

- Los factores desencadenantes de un desmayo simple pueden incluir, no tomar suficiente líquido, permanecer de pie en un mismo lugar

Recalentamiento, emociones, espasmos de Hanto entre otros. Los síntomas del desmayo son: Mareo, Náuseas, Sensación de calor, visión borrosa, Zumbido en los oídos, Aspecto pálido o camiento.

conclusión

La persona puede doblarse o caerse al suelo una persona suele volver en si menos de 4 min también se pierde el tono muscular, si la persona esta consciente, no hay que abandonarla.