


algunas veces durante la
segunda generación
provocar samolección
sus efectos son prolongados
lo que permite una dosifi-
cación más cómoda.



Antipirético.

Antipirético
ASpirina

ASpirina

su acción consiste en
detener la producción
de ciertas sustancias
naturales que causan
Fiebre, dolor, inflamación
y coágulos sanguíneos


Analgésicos

Analgésico

Ibuprofeno

Ibuprofeno

El ibuprofeno es un
antiinflamatorio no
esteroidal utilizado
frecuentemente como
antipirético analgésico
y antiinflamatorio



sedantes

sedante

diazepam

Diazepam

un farmaco derivado en la
la benzodiazepina que actúa
como modulador alosterico



Anestésico

Anestésico

lidocaína

codena

se le considera un
narcótico puede presentarse
en forma de cristales



Diuréticos

Diurético
furosemida

furosemida

Es un diurético de esa
utilizado en el tratamiento
de la insuficiencia cardíaca
congestiva



Antiespasmódicos

Antiespasmódicos

Atropina

Atropina

Farmaco antagonista
muscarínico extraído de
belladona y otras plantas
de la familia solanacea



Expectorante

Expectorante

codena

Lidocaína


ES un fármaco perteneciente a la familia de los anestésicos locales concretamente del tipo de las amino amidas entre los que también se encuentran la dibucaina



Bacteriostático


Bacteriostático
Sulfamidas

y niños mayores de 2 años que tienen síndrome de Lennox-Gastaut



Convulsión

una convulsión es una alteración eléctrica repentina y no controlada en el cerebro puede provocar cambios en el comportamiento los movimientos y sentimientos y en los niveles de



Antiemético

Antiemético

Metoclopramida

Metoclopramida

Es un antiemético y agente procinético. Se utiliza comúnmente para tratar la náusea y el vómito para facilitar el vaciamiento.



Clindamida

tipo de antibióticos eficaces
contra mucha bacteria
gram-positivas y bacterias
se aplican directamente
sobre la piel



Anticonvulsivos

Anticonvulsivos


Clobazam

Clobazam

Se usa con otros
medicamentos para controlar
convulsiones en adultos

Estazolam

por lo general se toma según sea necesario a la hora de acostarse o después de ir a la cama y tener dificultad para conciliar el sueño.



Antihistaminicos

Antihistaminicos
cetirizina

Cetirizina

Es un fármaco utilizado para el tratamiento de la alergia. Es un antihistamínico.

Antibióticos

Antibióticos
Amoxicilina

Amoxicilina.

Se usa para tratar algunas infecciones provocadas por bacterias como la neumonía la bronquitis infección de las vías respiratorias




Tranquilizantes

Tranquilizante
estazolam

conciencia

Valproato

un fármaco antiepiléptico
y estabilizador del estado
de ánimo no relacionado



Antihelmínticos

Antihelmínticos

niclosamida

Niclosamida.

Actúa localmente por
contacto directo con el
esófago de la tenia
inhibiendo la fosforilización
oxidativa en las
mitocondrias del
parásito

