





EMILY MIRANDA GUILLÉN

ALBÚN DE



ESQUEMA DE VACUNACIÓN



BCG

La Vacuna **BCG** se administra estrictamente por VIA INTRADÉRMICA en la cara externa superior del brazo (en la región superior de la inserción distal del músculo deltoide) y en la cara externa del muslo (a la altura del trocánter mayor). El lugar **donde** va a aplicarse la inyección debe estar limpio y seco.


Se administra 1 dosis a todos los niños independientemente del peso ☺



Hepatitis B (hep)

La **vacuna se aplica** mediante inyección intramuscular, en el muslo izquierdo en niñas y niños

La **primera dosis** se debe de administrar a los recién nacidos durante las primeras 24 horas de vida, **seguida de una** segunda dosis en el primer o segundo mes y **la tercera** a los 6 meses (180) días. 😊



Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

La vacuna contra el **Hib**, generalmente **se administra** en 3 o 4 dosis (dependiendo de la marca). La vacuna contra el **Hib** **se puede aplicar** como una dosis única, o como parte de una combinación de vacunas (un **tipo** de vacuna que combina más de una en una sola inyección).

La vacuna se aplica en el brazo



Difterla, Tétanos y pertussis acelular (DTPa) o ***Difteria, Tétanos y pertussis de células enteras*** ***(DTP)***

La **vacuna DPT** se aplica a tu hija (o) mediante una **inyección** intramuscular en el brazo izquierdo.


Las 3 primeras dosis y el primer esfuerzo se debe de aplicar se puede aplicar mediante vacunas combinadas, todo niño debe de haber recibido 4 dosis al cumplir 2 años de edad el segundo refuerzo entre los 4 o 6 años se administra.



Difteria tétanos pertussis acelular

Se inyecta vía intramuscular en el muslo o brazo. A partir de 7 años de edad y en adultos la vacuna recomendada es Td.

En adolescentes se administra una dosis de dTpa a partir de los 10 años, en las mujeres embarazadas en la semana 20 y 36 de gestión.



Difteria y Tétanos dT

Se inyecta por vía intramuscular en el muslo o el brazo, según la edad.

Se debe de administrar un refuerzo cada 10 Años.



Vacuna polio

inactivada (VPI)

Se inyecta por vía intramuscular en el muslo o el brazo, según la edad.

Son 4 dosis de VPI tres dosis en el esquema primario más 1 refuerzo.



Vacuna neumocócica *conjugad (VNC)*

Se aplica por vía intramuscular en la región anterolateral del muslo a los bebés que no caminan, y en el brazo a los niños que deambulan.


Se administran entre los dos y 59 meses de edad. Las dos vacunas disponibles (VNC10 y VNC13) se puede administrar de 2 o tres dosis primarias



Sarampión, rubeola y parotiditis (SRP)

La **vacuna** triple viral (SRP) contra el **sarampión**, la **rubéola** y la parotiditis. ¿Cómo **se aplica la vacuna** triple viral (SRP)? La **vacuna se aplica** mediante una inyección en el brazo izquierdo.

Se administra la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad.



Varicela (VAR)

Se inyecta por vía subcutánea en el muslo o en el brazo, según la edad.

La primera dosis se administra entre 12 y 15 meses y una segunda entre los dos y seis años



Influenza

La **vacuna** inyectable contra la **influenza** (gripe) se administra mediante una aguja, generalmente en el brazo.

Se administra a todas las personas a partir de seis meses de edad.



Rotavirus (VR)

Ambas **vacunas** se administran por la boca (vía oral). Actualmente en el esquema de vacunación se emplea la **vacuna** pentavalente, consiste en 3 dosis, la primera entre las semanas 6 y 12 de edad.



Hepatitis A (HepA)

Se les administra en el brazo derecho mediante una inyección intramuscular.

Se administra 2 dosis a o partir de los 12 mese de edad, separadas por un intervalo mínimo de seis meses



Virus del papiloma humano (VPH)

se administra en inyección intramuscular a través de la piel en el músculo (preferiblemente en el músculo de la parte superior del brazo o muslo).

Se recomienda administrar VPH2 en niñas a partir de los nueve años con un esquema de dos dosis de los 0 y a los seis y 12 meses

Se recomienda administrar VPH4 en niñas y niños a partir de los nueve años.



Meningocócica

Se inyecta por vía intramuscular en el muslo o el brazo, según la edad.



Fiebre amarilla (FA)

La **vacuna** contra la **fiebre amarilla** se administra mediante una sola **inyección** subcutánea o intramuscular (0,5 ml por dosis), aunque **se** prefiere la vía subcutánea.

Se administran a residentes o viajeros a zonas de riesgo. Se contraindica en el embarazo y lactancia.

