



Lubgan ha Rios

Album de vacunación

Giencias de la Salud

4.to bach

Mishel De León


Feb 17/02

BCG

Se administra por vía intradérmica.

Recién nacido.

Única dosis




Hepatitis B

Se administra por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo.

Recién nacido.

Única dosis.



Poliomielitis

Se administra por vía intramuscular.

2 meses


4 meses Primera dosis

6 meses Segunda dosis

Tercera dosis

Primer refuerzo 1 año

Segundo refuerzo 4 años




Pentavalente

Se aplica por vía intramuscular en el muslo derecho.

2 meses


Primera dosis,
Segunda dosis 4 meses
Tercera dosis 6 meses



Rotavirus

Se administra vía oral


Primera dosis 2 meses
Segunda dosis 4 meses



Neumococo

Se administra por vía intramuscular.

Primera dosis 2 meses
Segunda dosis 4 meses
Refuerzo 1 año




Influenza

Se administra vía intramuscular.

Primera dosis 6 meses

segunda dosis 7 meses



SPP

Se administra vía subcutánea en el brazo.

Primera dosis 1 año


Segunda dosis 1 año 8 meses



Hepatitis a

Se administra por vía intramuscular en el muslo.


Única dosis



Varicela

Se administra por vía subcutánea en el muslo o brazo


Única dosis



DPT

Se administra por vía intramuscular en el brazo izquierdo.

Primer refuerzo 1 año 8 meses
Segundo refuerzo 4 años



061

VPH

Se administra por vía intramuscular en el brazo.

menor de 15 años (9 años)

segunda dosis después de 6 meses.

