

Album de tipos de medicamentos

Nombre: Emily Guillén

Curso: Ciencias de la
salud

Catedrática: Mishell de Leon



ANALGÉSICOS

Acetaminofén

El acetaminofén viene en forma de tabletas, tabletas masticables, cápsula, suspensión o solución (líquido), de liberación gradual (de acción prolongada) comprimidos, y la tableta de desintegración oral (pastilla que se disuelve rápidamente en el boca), **para tomar por vía oral**, con o sin comida. El acetaminofén está disponible sin receta médica, pero su médico le puede recetar acetaminofén para tratar ciertas condiciones. Siga las instrucciones de la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda



TRANQUILIZANTES

Alprazolam (Frankimazin)

se comercializan en comprimidos, por lo tanto, Alprazolam y se toman **por vía oral** (es decir, tragando los comprimidos). Alprazolam tiene una particularidad y es que se puede absorber por vía sublingual (se pone debajo de la lengua) si se quiere conseguir un efecto un poco más rápido.



ANTIbióTICOS

Amoxicilina

la amoxicilina es estable en medio ácido en presencia de jugos gástricos y puede ser administrada **por vía oral** in tener en cuenta el ritmo de las comidas. Se absorbe rápidamente después de la administración oral, alcanzando los niveles máximos en 1-2.5 horas.



ANTIhiSTAMínicos

Desloratadina (Clarinet)

La presentación de la desloratadina es en una tableta, una solución oral (líquido) y una tableta de desintegración oral **para administración oral**. Usualmente se toma una vez al día, con o sin alimentos. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome la desloratadina exactamente como se le indique. No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico.



Antipiréticos

Dipirona

Las dosis habituales por vía parenteral son de 0,5 a 1 g por vía intravenosa principalmente, pero también puede aplicarse por vía intramuscular o subcutánea



Antiémético

Perfenazina

La perfenazina es un agente antipsicótico activo por vía oral, pertinente a la familia de las fenotiazinas



Antiemético

Escopolamina

Escopolamina B. Braun puede administrarse por vía subcutánea, intravenosa o intramuscular. Cuando **se administra por vía intravenosa**, debe diluirse previamente en agua estéril para inyección.



Antiespasmódicos

Trimebutina

La trimebutina es un fármaco antiespasmódico, que se utiliza por vía oral, vía intravenosa, intramuscular o rectal en el tratamiento del dolor abdominal y otros trastornos abdominales incluyendo el síndrome del colon irritable



EXPECTORANTE

Expectorante

AMBROXOL está indicado como expectorante

Farmacocinética: El fármaco se absorbe rápidamente por vía oral a nivel del intestino. Cuando se toma en ayunas, la concentración máxima en el plasma sanguíneo ocurre a las 2 1/2



Diuréticos

Espironolactona / altizida

La espironolactona actúa como un diurético ahorrador de potasio, provocando un aumento de la excreción de sodio y agua y manteniendo los niveles de potasio y magnesio.

Vía oral. Administrar siempre a la misma hora del día con o sin comida.



Sevantes

Diazepam (Valium®)

Valium se administra mediante una inyección intramuscular profunda. Valium también puede administrarse por vía intravenosa con las siguientes soluciones electrolíticas de perfusión: NaCl 0,9%, Dextrosa 5,5% o Dextrosa 10%.



Anestésicos

Propofol.

Vía intravenosa. Propofol Fresenius 20 mg/ml se administra intravenosamente sin diluir mediante inyección o perfusión continua. Propofol Fresenius 20 mg/ml no se debe administrar como una inyección en bolus para el mantenimiento de la anestesia.



BACTERIOSTÁTICOS

Cefadroxilo Cefalexina

El cefadroxilo se presenta en cápsulas, tabletas y en suspensión (líquido) para administración oral. Usualmente se toma con o sin alimentos cada 12 o 24 horas. Tome el cefadroxilo aproximadamente a la misma hora todos los días.



Anticonvulsivos

Clobazam

Se administra por vía oral.

El clobazam se usa con otro(s) medicamento(s) para controlar convulsiones en adultos y niños mayores de 2 años que tienen síndrome de Lennox-Gastaut (un trastorno que causa convulsiones y a menudo causa retrasos en el desarrollo). El clobazam pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos.



Antihelmínticos

Mebendazol

La presentación del mebendazol es una tableta masticable. Cuando el mebendazol (Emverm) se usa para tratar ascáride, tricocéfalo y lombrices intestinales, normalmente se toma dos veces al día, por la mañana y por la noche, durante 3 días.

Por vía oral



espero le agrade mi
trabajo seño siempre

me esmero por

hacerlo.

Termino el trabajo

