# Álbum con las vacunas que se administran desde que nacen hasta los 10 años.

**1. BCG. Se administra** estrictamente por VIA INTRADÉRMICA en la cara externa superior del brazo (en la región superior de la inserción distal del músculo deltoide) y en la cara externa del muslo (a la altura del trocánter mayor).

# Hepb

La **vacuna** general mente **se aplica** en 2, 3 o 4 inyecciones. Los bebés deberían tener su primera dosis **de la vacuna** contra la **hepatitis B** al momento de su nacimiento y completar la serie a los 6 meses de edad (a veces completar la serie puede tomar más de 6 meses).

# Haemophilus influenzae

## Tipo b Hib

A los bebés normalmente **se** les aplica la primera dosis de la **vacuna** contra el **Hib** a la **edad** de 2 meses y normalmente la serie **se** completará entre los 12 a 15 meses

# DTPA DTP

**Se inyecta por vía intramuscular en el muslo o el brazo, según la edad. A las 18 meses Segunda dosis de SPR, primer refuerzo de Polio (OPV) y DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos). A los 4 años segundo refuerzo de Polio (OPV) y DPT. A los 10 años Refuerzo TD 3 (Tétano y Difteria)**

# DTpa

La DTPa se administra por medio de una inyección, usualmente en el brazo o el muslo.

Está indicada para la inmunización activa contra el Tétanos, la Difteria y la Tos ferina en lactantes y niños entre 2 y 18 meses de nacidos. Se recomienda tanto para una



# Difteria y tétanos

## dT

Administración IM profunda (deltoides o región mediolateral del muslo).
Una dosis es de 0,5mL.
Administrar la 1era dosis a los 2 meses; la 2da dosis a los 3 meses y la 3ra dosis, a los 4 meses de edad.

# Vacuna polio inactiva vpi

La **vacuna** antipoliomielítica inactivada
(**VPI**) **se** suele **administrar** a las **edades** de 2 meses, 4 meses, 6-18 meses y 4-6 años. A veces,
la **vacuna** antipoliomielítica oral (VPO) **se da** junto con otras **vacunas**. En este caso, el niño podría recibir una quinta dosis de VPO.



# Vacuna neumocócica

Se aplica por vía intramuscular en la región anterolateral del muslo a los bebés que no caminan, y en el brazo a los niños que deambulan.

Para inyección IM en la parte anterolateral del muslo en niños < 2 años y en el músculo deltoides en niños ≥ 2 años. NUNCA INYECTAR EN EL GLÚTEO.

# VACUNA SRP

A partir de los 10 años
de edad la vacuna se aplica en el brazo izquierdo mediante una inyección: Una dosis si tu hija (o) no recibió la segunda dosis de triple viral (SRP) a la edad de 6 años; Dos dosis, si tu hija (o) no recibió dosis previa de SR o SRP con intervalo de cuatro semanas entre cada una.

# V A R

Los niños de 12 meses hasta los 12 años de edad deben recibir 2 dosis de la vacuna contra la varicela, generalmente:

- **Primera dosis**: de los 12 a los 15 meses de edad.
- **Segunda dosis**: de los 4 a los 6 años de edad.