

Herida.

Las heridas son muy frecuentes y en ocasiones pueden implicar gravedad e incluso riesgos para el ser humano. Es muy importante las limpiezas de las heridas. Emplear tiras, antisépticos, apósitos y la desinfección. Se consigue una rápida cicatrización.

Las heridas son el resultado de una rotura de la superficie de la piel. La lesión tisular se repara mediante el recambio de tejidos lesionados. Las heridas son causadas por cortes, desgarrs, quemaduras y aplastamiento de la piel. También son causa de heridas de las corrientes eléctricas intensas, química y la interrupción del aporte sanguíneo.

Hay que evaluar la posibilidad de que el paciente no declare la verdad sobre el origen de sus heridas. Si se trata de un niño, debe tenerse en cuenta la posibilidad que haya lesiones causadas con entorno doméstico o no doméstico.

Tipos de heridas.

Abiertas = cuando muestran una abertura en el tejido

Contusas = son lesiones de los tejidos

Incisas = producidas por objetos cortantes.

Penetrantes = los que entra en una cavidad corporal

Ponzantes = causadas por instrumentos ponzantes.

Heridas agudas

La causa más frecuente de las heridas agudas es el bisturí del cirujano. Algunas heridas producen complicaciones graves al paciente. Un porcentaje de las heridas experimenta complicaciones. Durante el proceso de curación pueden producirse necrosis, dehiscencia de la sutura, hematoma e infecciones.

Heridas pequeñas y erosiones

Hay heridas que se reducen a arañazos, rozaduras o cortes superficiales. En estos casos basta secar la gota de sangre y aplicar una tira. Este tipo de heridas requiere una limpieza y desinfección.

La gravedad de las quemaduras aumenta cuando resultan afectadas áreas de la piel.

Heridas incisas profundas

Las heridas superficiales puede ser tratadas sin necesidad de la asistencia de un médico, por el contrario, las heridas profundas siempre deben ser tratadas por facultativos. Las heridas de arma blanca suelen presentar un corte exterior pequeño y una gran profundidad, por lo que son muy profundas.

Quemaduras

Después de una quemadura se produce una lesión por coagulación y desnaturalización de las proteínas celulares. La gravedad de las quemaduras aumentan cuando resultan afectadas áreas amplias de piel o cuando la lesión es profunda, cuando mayor haya sido la temperatura causante de la lesión.

