



Recien
Nacido



Hepatitis B.

En las primeras 24 horas de vida o lo antes posible antes de cumplir un mes de edad.

La vacuna se aplica mediante inyección intramuscular, en el muslo izquierdo.




BCG ★

Al nacer o lo antes posible antes de cumplir un año

Esta vacuna es una dosis inyectada en el brazo derecho, y deja una pequeña cicatriz




Meses.



Primera Dosis Polio




La aplicacion
de esta
Vacuna es
2 gotas
Vía Oral.



Primera Dosis Pentavalente.



Esta vacuna
es aplicada
en la pierna
derecha.



IPV

Se aplica
la vacuna
en la
pierna izquierda.



Primera Dosis Neumococo

La aplicación de
esta vacuna es
2 dedos abajo de
la vacuna de IPV



Primera Dosis Rotavirus.

Esta vacuna
se aplica por
vía oral.




4 Meses




Segunda Dosis Polio

La aplicacion
de esta
vacuna es
2 gotas
Vía oral.



Primera Dosis Pentavalente

Esta vacuna
se
administra
en la
pierna
derecha.




Segunda Dosis Neumococo.

Esta vacuna
se aplica
inyectada en
la pierna
izquierda.



Segunda Dosis Rotavirus.

Esta vacuna
es una dosis
aplicada por
vía oral



6 Meses



Tercera Dosis Polio.

La aplicación
de esta
vacuna es
2 gotas
vía oral.



Tercera Dosis Pentavalente

Esta vacuna
se aplica
en la
pierna
derecha.




12 Meses



Primera Dosis de SPR

Esta vacuna
es aplicada
en el
brazo
izquierdo



Refuerzo de Neumococo.

La aplicación
de la vacuna
es en la
pierna
izquierda



m18 Meses



Segunda Dosis de SDR.

La aplicación de la vacuna es en el brazo izquierdo




Primer Refuerzo de Polio.

La aplicación de esta vacuna es tomada 2 gotas.



DPT.

La aplicación de esta vacuna es en la pierna derecha




My 4 Años




Segundo Refuerzo de Polio.

Su aplicación es 2 gotas vía oral.



Segundo Refuerzo de DPT.

Su aplicación de esta vacuna es inyectada en la pierna derecha.




10 Años





TD

La aplicación de esta vacuna es en el brazo izquierdo




HPV.

Esta vacuna cuenta con 2 dosis se aplica en el brazo izquierdo mediante una inyección intramuscular. Después de 6 meses se aplicará la 2da dosis.



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**



Stephany Paola Garcia
Escobar 4to bachillerato en
ciencias y letras con
diplomado en medicina 🧑