

Armando

Lemus.

Primeros Auxilios.

Mishell De León

4to Medicina.

Fracturas habituales.

El factor fundamental es un único traumatismo cuya violencia es capaz de desencadenar una fractura en un hueso de cualquier calidad.

Fracturas por insuficiencia.

El factor fundamental es la debilidad ósea. Pueden deberse a procesos generales que cursen con osteopenia y osteosclerosis.

Fracturas incompletas.

La línea de fractura no abarca todo el espesor del hueso.

Podemos encontrar:

Fisuras: Que afectan a parte del espesor.

Fracturas en tallo verde

Tipos de fracturas.

Fracturas completas.

Existe solución de continuidad y afecta todo el espesor del hueso y periostio. Se pueden dividir:

Fracturas completas simples,
Fracturas completas con el desplazamiento, según el eje longitudinal.

Estables.

Son las que no tienen tendencia a desplazarse tras conseguir la reducción. Son fracturas de trazo transversal oblicuo menor de 45° .

Inestables.

Son las que tienden a desplazarse tras la reducción. Son fracturas con un trazo oblicuo mayor de 45° excepto las de trazo epiroides.

Fractura por fatiga o estrés.

La fractura es el resultado de solicitaciones mecánicas repetidas.

Fractura por mecanismo directo.

Son las fracturas producidas en el lugar del impacto de la fuerza responsable.

Fracturas por mecanismo indirecto.

Son las fracturas que se producen a distancia del lugar del traumatismo.

Fracturas por compresión.

La fuerza actúa en el eje del hueso, suele afectar a las vértebras, meseta tibial y calcáneo. Se produce un aplastamiento, pues cede el sistema trabecular vertical.