


*Álbum de vacunas que se
administran desde los 6 meses
a los 16 años 🥰*



Hepatitis B

En las primeras 24 horas de vida o lo antes posible antes de cumplir un mes de edad.

La vacuna se aplica mediante inyección intramuscular en el muslo izquierdo.



BCG

Al nacer o lo antes posible antes de cumplir un año.


Esta vacuna es una dosis inyectada en el brazo derecho.



Al nacer

Poliomielitis

Primera Dosis



La vacuna debe administrarse únicamente por vía oral.

Pentavalente

Primera Dosis



Es mediante una inyección intramuscular en el muslo Derecho.

2 meses

Neumococo

Primera Dosis



La aplicación es intramuscular.

Rotavirus

Primera Dosis



Es administrado en gotas por vía oral.

Poliomielitis

Segunda Dosis



La vacuna debe administrarse únicamente por vía oral.

Pentavalente

Segunda Dosis



Es mediante una inyección intramuscular en la región del hombro.

4 meses

Neumococo

Segunda Dosis



La aplicación es intramuscular.

Rotavirus


Segunda Dosis



Es administrada en gotas por vía oral.

Poliomielitis

Tercera Dosis



La vacuna debe administrarse únicamente por vía oral.

Pentavalente

Tercera Dosis



Es mediante una inyección intramuscular en el muslo derecho.

6 meses

SPR

Primera Dosis



La vacuna
se aplica
mediante una
inyección en
el brazo.

Neumococo

Refuerzo de neumococo.



La aplicación
es intramuscular.

SPR

Segunda Dosis



La vacuna se aplica mediante una inyección en el brazo.

Polio mielitis

Primer refuerzo.



La vacuna se administra únicamente por vía oral.

18 meses

DPT

Primer refuerzo



Se aplica mediante una
inyección intramuscular
en el brazo izquierdo

Polio mielitis

Segundo refuerzo.



La vacuna
se administra
orocualmente
por vía oral.

DPT

Segundo refuerzo.



Se aplica
mediante una
inyección
intramuscular en
el brazo izquierdo.

4 años