

Tipos de inmovilizaciones.

En medicina se le conoce como inmovilización a este procedimiento, o técnica que limita el desplazamiento del hueso este proceso también es utilizado en los primeros auxilios. Es para mantener al paciente sin movimiento en la lesión hasta que lo atienda el personal sanitario.

El yeso o escayola: es una venda de tela y sulfato de calcio que se utiliza para corregir las lesiones traumáticas, su objetivo es mantener inmóvil.

Yeso braquio-palmar: Se extiende desde el borde inferior de la axila. La muñeca queda inmovilizada en ligera flexión dorsal y en posición neutra, mientras que el codo queda en una flexión de unos 100° .

Yeso antebraquio - digital: incluye desde 3 cm por debajo del codo hasta la falange distal de los dedos.

Toraco - braquial

incluye todo el miembro superior afectado, desde el hombro hasta la mano, además comprende el tronco y abdomen. El brazo queda en abducción de 70° ante versión de 30° a 40° y rotación.

Yeso inguinopodico

incluye todo el miembro inferior, desde el pliegue inguinal, región trocantenérea y por detrás a nivel del pliegue glúteo has el pie; su límite inferior en la cara dorsal del pie llega hasta la raíz de los dedos y por la cara plantar hasta 1-2cm más allá de los punta de los dedos. Se utiliza para tratar las fracturas de diafisis de la tibia, de rotula y las fractura supracondiles.

Yeso tipo tubo o cruzo maleolar

Se aplica desde la parte superior del muslo hasta el tobillo para las fracturas de la parte

inferior de la pierna o la rodilla
luxaciones de rodilla o después de una
intervención quirúrgica en esta zona

Y esa tipo de bota

Esto abarca desde la base de los
mucizos de los platillos tibiales,
tuberosidad anterior de la tibia y
por detrás hasta unos 5-7 cm bajo
el pliegue de flexión de la rodilla