

[introduccion](#) 1

[árbol de cedro](#) 2

[Monja blanca](#) 3

[Las palmas aceiteras de corozo \(Elaeis oleifera\).](#) 4

[El pinabete \(Abies guatemalensis\).](#) 5

[Las ceibas \(Ceiba speciosa\).](#) 6

[árbol de naranja](#) 7

árbol de cedro

Debido al alto valor de su madera, el cedro rojo es de las especies preferidas para reforestar las zonas tropicales de México. ... También se usa su madera como combustible o leña y como materia de construcción en el medio rural. Es útil para fabricar implementos de trabajo y agrícolas.

Los árboles en plantaciones se pueden aprovechar cuando alcanzan 45 cm de DAP. La edad aproximada en que alcanzan estas dimensiones es a los 20-25 años. Los árboles que crecen en espaciamientos mayores pueden mostrar mayor incremento diamétrico y alcanzar tamaños comerciales más rápidamente.



Monja blanca

Posee pseudobulbos gruesos de los cuales crecen las hojas largas. Las flores de esta especie, generalmente individuales, son triangulares, crecen desde la base del pseudobulbo más joven y miden entre 10 y 15 cm . El color de las flores puede variar desde completamente blancas, pasando por diferentes tonos de rosado hasta magenta y en casos muy excepcionales de color anaranjado melocoton.[2][3][1] Estas variaciones en el color las convierte en el mejor candidato como punto de partida para la formación de híbridos de Lycaste.[4] El período de floración es entre noviembre y abril, con un máximo a finales de enero y principios de febrero, en el cual una planta madura puede producir entre 4 y 12 flores durante la época de floración, y cada una con una duración de entre 6 y 8 semanas.



Las palmas aceiteras de corozo (*Elaeis oleifera*).

La palma americana de aceite, palma aceitera o nolí son los nombres como se conoce *Elaeis oleifera*, palma del género *Elaeis*. También se la conoce como: corozal, corozo, palma de cebo, coqueiro de dente, coquito, palmique, yolí, corozo del Sinú, ñoli o corocito. Pertenece a la familia *Arecaceae*.



El pinabete (*Abies guatemalensis*).

El pinabete (*Abies guatemalensis*) –también conocido como oyamel de Guatemala, abeto de Guatemala, pashaque o romerillo– es un árbol o conífera perteneciente a la familia Pinaceae. Natural de Centroamérica se encuentra en el sur de México, Guatemala, norte de Honduras y en el sur de El Salvador.



Jonathan Luis Ángel
Revolorio Davila

Las ceibas (*Ceiba speciosa*).

Ceiba speciosa, popularmente llamada palo borracho o árbol del puente, es una especie del género *Ceiba* nativa de las selvas tropical y subtropical de Sudamérica. Tiene varios nombres comunes locales: palo borracho, árbol botella, toborochi, árbol de la lana, palo rosado, samohú, lupuna hembra



Jonathan Luis Ángel
Revolorio Davila

árbol de naranja

Citrus x sinensis, el naranjo, naranjero o naranjo dulce, es un árbol frutal del género *Citrus*, que forma parte de la familia de las rutáceas.

